

The 4th UTOPIA for CVD

IVR Session Round Table Discussion

Case 01

80s F


Rt. IC-PCom AN

(previously ruptured ,recurrence)

Case 01 80s F

現病歴	2年前に右IC-Pcom瘤の破裂によるSAH（WFNS Grade 1） Balloon assisted coilingで治療 水頭症に対してV-P shunt mRS 4で転院したが最終的にmRS 1となり自宅で生活 動脈瘤の再発を認め再治療を検討することとなった。
既往歴	高血圧 下肢静脈血栓症 肺血栓塞栓症（無症候） 胆嚢炎 骨粗鬆症
内服薬	カンデサルタン4mg アマルエット配合錠 リクシアナ30mg
生活歴	特記すべき事項なし
現症	軽度認知機能低下 その他明らかな神経学的異常を認めず


2年前の
SAH発症時
CT




Day0 Rt. ICAG




Rt. ICA 3D-RA




Rt. ICA 3D-RA



RAO 27 CAU 18




LAO 46 CAU 29






Day0 Lt. VAG






Day0 Lt. VAG Allcock test




- 
- ① Target 3D 5 × 10
 - ② Galaxy G3 XSFT 4 × 6
 - ③ Galaxy G3 XSFT 3.5 × 5
 - ④ Target 360 Nano 3 × 4

PD 22.1%


Balloon-assisted coiling





LAO 46 CAU 31




RAO 28 CAU 14







Rt. CCAG





Case 01 summary

- ✓ 破裂右IC-Pcom AN, coiling後再発
- ✓ Pcomはincorporated branch
- ✓ Rt. P1はAllcock testで描出される

To be discussed...

治療として血管内治療を行うとした場合、用いるテクニック、デバイスは？

- ① Simple coiling
- ② Balloon assist technique
- ③ Double catheter technique
- ④ Stent-assisted coiling
- ⑤ FD (+ coil)
- ⑥ その他

この再発瘤を治療するとして...

どのように治療しますか？

- Simple coiling
- Double catheter
- Balloon-assisted coiling
- Stent-assisted coiling
- FD (+coil)
- その他