

The 4th UTOPIA for CVD IVR Session Round Table Discussion

Case 02





74F

ACoA AN
(unruptured)

Case 02 74F


現病歴	頭重感の精査で施行された頭部MRIで前交通動脈瘤を指摘され、当科紹介受診となった。
既往歴	HT、DM、脂質異常症、逆流性食道炎、不眠症、緑内障 心筋梗塞
内服薬	アスピリン、プラスグレル、ランソプラゾール、アジルサルタン、ロスバスタチン、エゼチミブ
生活歴	特記すべき事項なし
現症	難聴 その他神経脱落症状なし

MRA




ACoAに7mm大の動脈瘤
Rt.A1は低形成

DSA




bovine archではあるが、アプローチルートに問題なし

右総頸動脈撮影(正面)




右総頸動脈撮影(側面)




左内頸動脈撮影(正面)



左内頸動脈撮影(側面)




左内頸動脈撮影




左内頸動脈撮影(右総頸動脈圧迫)





3D-RA




3D-RA




3DDSA



ワーキングアングル(正面)



ワーキングアングル(側面)



Case 02 summary

- ✓ 未破裂ACoA動脈瘤 (7mm)
- ✓ Rt. A1はhypoplasia
- ✓ Wide neck、Low aspect ratio

To be discussed...

治療として血管内治療を行うとした場合、用いるテクニック、デバイスは？

- ① Simple coiling
- ② Balloon assist technique
- ③ Double catheter technique
- ④ Stent-assisted coiling
- ⑤ WEB
- ⑥ その他